

## 中文說明

# TSUMURA 漢方 抑肝散 提取物顆粒

【第二類醫藥品】

### 功能和效果

用於中等體力、有神經亢奮、易怒、煩躁等徵候的人士

的以下各種症狀：

神經症、失眠症、小兒夜啼、小兒驚風(神經過敏)、

磨牙症、更年期障礙、血道症<sup>注)</sup>

<sup>注)</sup> 血道症是指：隨著月經、妊娠、分娩、產後、更年期等女性荷爾蒙變動而出現的精神不安、煩躁、焦慮等精神神經症狀及身體症狀。



### 注意事項

#### ×禁止事項

(如果不遵守，則目前的症狀有可能惡化，或容易引起副作用)

以下人士請勿服用：

出生後未滿3個月的嬰兒。

#### □諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
- (3) 腸胃弱的人士
- (4) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士

2. 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用，請立即停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍做劇烈運動就會氣喘、呼吸困難、出現乾咳、發熱等症狀、此類症狀會突然出現或持續
心力衰竭	一運動就呼吸困難、容易疲勞、腳浮腫、體重激增
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸(皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等

3. 如果服用1個月左右(針對小兒夜啼服用時則為1周左右)症狀仍未好轉，請停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

## 用法和用量

請按以下用量，在餐前用涼開水或溫水送服：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
4 歲以上未滿 7 歲	1/2 包	
2 歲以上未滿 4 歲	1/3 包	
未滿 2 歲	1/4 包	

<用法用量的相關注意事項>

1. 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用。
2. 未滿 1 歲的嬰兒請優先接受醫生的診治，只有在不得已的情形下方可喂服。

## 成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的抑肝散提取物 (1/2 量) 1.625g：

日本藥典蒼術	2.0g
日本藥典茯苓	2.0g
日本藥典川芎	1.5g
日本藥典鉤藤鉤	1.5g
日本藥典當歸	1.5g
日本藥典柴胡	1.0g
日本藥典甘草	0.75g

有關添加物：含有日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物

## 保管及使用注意事項

1. 請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
2. 請於幼兒無法觸及之處保存。
3. 1 包分次服用的，如袋中尚有剩餘藥劑，請將袋口翻折保存，並在 2 天內服用完畢。
4. 本劑使用了生藥（藥用的草根樹皮等），因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況，但並不影響其功能和效果。
5. 請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>