

中文说明

TSUMURA 汉方清上防风汤提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于中等体力以上，面色赤红且时有上火的人士的以下各种症状：
暗疮、面部或头部有湿疹或皮肤炎、酒渣鼻（酒渣）



注意事项

□咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 肠胃弱的人士
- 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

| 相关部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 消化系统 | 食欲不振、胃部不适 |

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

| 症状名称 | 症 状 |
|---------|---------------------------------------|
| 肝功能障碍 | 出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等 |
| 肠系膜静脉硬化 | 由于长期服用，反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀感等 |

- 如果服用1个月左右症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 如果需要长期连续服用，请咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 服用本剂后，可能偶尔会发生症状恶化情况，在此情形下请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员

用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

| 年 龄 | 1 次用量 | 1 天服用次数 |
|--------------|--------------|---------|
| 15 岁及以上成人 | 1 包 (1.875g) | 2 次 |
| 7 岁以上未满 15 岁 | 2/3 包 | |
| 4 岁以上未满 7 岁 | 1/2 包 | |
| 2 岁以上未满 4 岁 | 1/3 包 | |
| 未满 2 岁 | 请勿服用 | |

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的混合生药干燥提取物 2.375g：

| | |
|---------|-------|
| 日本药典黄芩 | 1.25g |
| 日本药典桔梗 | 1.25g |
| 日本药典山梔子 | 1.25g |
| 日本药典川芎 | 1.25g |
| 日本药典珊瑚菜 | 1.25g |
| 日本药典白芷 | 1.25g |
| 日本药典连翘 | 1.25g |
| 日本药典黄连 | 0.5g |
| 日本药典甘草 | 0.5g |
| 日本药典枳实 | 0.5g |
| 日本药典荆芥 | 0.5g |
| 日本药典薄荷 | 0.5g |

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1 包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于 2 日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>