

中文说明

TSUMURA 汉方 防风通圣散 提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于体力充沛，腹部皮下脂肪多、经常便秘的人士的
以下各种症状：
高血压或肥胖所伴随的心悸、肩酸、上火、浮肿、
便秘、积脓症（鼻窦炎）、湿疹或皮肤炎、痤疮（暗疮）
肥胖症



注意事项

×禁止事项

（如果不遵守，则目前的症状有可能恶化，或容易引起副作用）

1. 服用本药剂的期间，请勿服用以下药品：其他泻药
2. 哺乳期的人士请勿服用本药剂，或者服用本药剂期间请勿哺乳

□咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - (1) 正在接受医生治疗的人士
 - (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
 - (3) 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
 - (4) 肠胃弱、容易腹泻的人士
 - (5) 容易出汗的人士
 - (6) 老年人
 - (7) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
 - (8) 有以下症状的人士：浮肿、排尿困难
 - (9) 被诊断为患有以下疾病的人士： 高血压、心脏病、肾脏病、甲状腺机能障碍
2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	恶心、呕吐、食欲不振、胃部不适、腹胀、伴随剧烈腹痛的腹泻、腹痛
精神神经系统	眩晕
其 他	发汗、心悸、浮肿、头痛

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症 状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难，出现干咳、发热等症状，此类症状会突然出现或持续
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外，还出现乏力感、肌肉痛，并逐渐增强
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等
肠系膜静脉硬化	由于长期服用，反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀感等

3. 服用后可能会出现以下症状，如果此类症状持续或增强，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：腹泻、便秘

- 如果服用 1 个月左右（针对便秘服用时则为 1 周左右）症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 如果需要长期连续服用，请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 包（1.875g）	2 次
7 岁以上未满 15 岁	2/3 包	
4 岁以上未满 7 岁	1/2 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/3 包	
未满 2 岁	请勿服用	

〈用法用量的相关注意事项〉 幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2 包本品（3.75g）中，含有下述比例的防风通圣散提取物 2.25g：

日本药典滑石	1.5 g
日本药典黄芩	1.0 g
日本药典甘草	1.0 g
日本药典桔梗	1.0 g
日本药典石膏	1.0 g
日本药典白术	1.0 g
日本药典大黄	0.75 g
日本药典荆芥	0.6 g
日本药典山栀子	0.6 g
日本药典芍药	0.6 g
日本药典川芎	0.6 g
日本药典当归	0.6 g
日本药典薄荷	0.6 g
日本药典防风	0.6 g
日本药典麻黄	0.6 g
日本药典连翘	0.6 g
日本药典无水芒硝	0.35 g
日本药典生姜	0.15 g

有关添加物：含有日本药典轻质无水硅酸、日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

- 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
- 请在幼儿无法触及之处保存。
- 1 包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于 2 日内服用完毕。
- 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
- 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>