

中文说明

TSUMURA 汉方桂枝加芍药药大黄汤提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于中等体力以下，有腹胀感、腹痛、便秘的人士的以下各种症状：

便秘、里急后重^{注)}

注) 里急后重是指有残便感，腹痛窘迫，时时欲便的症状。



注意事项

×禁止事项

(如果不遵守，则目前的症状有可能恶化，或容易引起副作用)

1. 服用本药剂的期间，请勿服用以下药品：

其他泻药

2. 哺乳期的人士请勿服用本药剂，或者服用本药剂期间请勿哺乳

□咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- (1) 正在接受医生治疗的人士
- (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
- (3) 肠胃虚弱、容易腹泻的人士
- (4) 老年人
- (5) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- (6) 有以下症状的人士：

浮肿

(7) 被诊断为患有以下疾病的人士：

高血压、心脏病、肾脏病

2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	伴随有剧烈腹痛的腹泻、腹痛

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症 状
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外，还出现乏力感、肌肉痛，并逐渐增强

3. 服用后可能会出现以下症状，如果此类症状持续或增强，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

腹泻

4. 如果服用1周左右(针对里急后重服用时服用5-6天)症状仍未好转, 请停止服用, 持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
5. 如果需要长期连续服用, 请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量, 在餐前用凉开水或温水送服:

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 岁以上未满 15 岁	2/3 包	
4 岁以上未满 7 岁	1/2 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/3 包	
未满 2 岁	请勿服用	

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时, 请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中, 含有下述比例的混合生药干燥提取物 2.0g:

日本药典芍药	3.0g
日本药典桂皮	2.0g
日本药典大枣	2.0g
日本药典甘草	1.0g
日本药典大黄	1.0g
日本药典生姜	0.5g

有关添加物: 含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1 包分次服用的, 如袋中尚有剩余制剂, 请将袋口翻折、保存, 并于 2 日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药 (药用的草根树皮等), 因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况, 但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编: 107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>